

Сімалджекс 30 мг
(таблетки)
листівка-вкладка

Опис

Довгасті таблетки білого або блідо-коричневого кольору з двома борознами, що поділяють кожну таблетку на три рівних частини.

Склад

1 таблетка містить діючу речовину:
сімікоксиб - 30,0 мг.

Допоміжні речовини: моногідрат лактози, кросповідон, натрію лаурилсульфат, натрію фумарат, сухий порошок свинячої печінки.

Фармакологічні властивості

ATC vet класифікаційний код: QM01AH93 Протизапальні і протиревматичні ветеринарні препарати, не стероїдні. Сімікоксиб.

Сімікоксиб належить до групи нестероїдних протизапальних препаратів групи коксібів, з сильною протизапальною, аналгетичною та жарознижувальною дією. Сімікоксиб діє як селективний інгібітор ензиму циклооксигенази 2 у циклі арахідонової кислоти. При цьому препарат впливає на циклооксигеназу 2, яка індукується у відповідь на розвиток запалення, в результаті чого блокується синтез простагландинів, які викликають запалення, набряк та біль.

Препарат має високу біодоступність із періодом напіврозпаду 1,38 (± 0.24) години.

Застосування

Лікування собак за бальового синдрому, гострих та хронічних захворюваннях опорно-рухового апарату запального характеру (остеоартрит), для аналгезії та як протизапальний засіб у пері-операційний період.

Дозування

Перорально у дозі 2 мг на 1 кг маси тіла один раз на добу.

При лікуванні тварин за хронічного остеоартриту курс може складати до 6 місяців. Для подальшого лікування необхідна консультація лікаря ветеринарної медицини.

У пері-операційний період: одна доза за 2 години до хірургічної операції та один раз на добу протягом 3-7 діб після операції. Необхідна консультація лікаря ветеринарної медицини.

Завдяки приємному смаку собаки охоче поїдають таблетки.

Протипоказання

Не застосовувати препарат собакам віком до 10 тижнів, вагітним та лактуючим самкам.

Не застосовувати разом з кортикостероїдами та іншими нестероїдними протизапальними препаратами.

Не застосовувати тваринам, чутливим до сімікоксибу або до допоміжних речовин.

Побічна дія.

При появі таких симптомів, як діарея, блювота або втрата ваги застосування препарату треба зупинити та звернутися до лікаря ветеринарної медицини.

Особливі застереження при використанні

Сімікоксиб може викликати подразнення шкіри — мийте руки після використання!

Передозування

У сімікоксибу немає специфічного антидоту.

При передозуванні слід звернутися до лікаря ветеринарної медицини.

Форма випуску

8 таблеток на алюмінієвому блістері, по 1, 4 і 18 блістерів у картонній коробці

45 таблеток у пастиковій (HDPE) пляшці із системою захисту від дітей, упакованій у картонну коробку.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей, місце при температурі від 10 до 25 °C.

Термін придатності — 3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення і виробник:

Ветоквінол С.А.

Магні-Вернуа - 70200 Люор

Франція

Тел: :+33 3 84 62 56 36

Факс: +33 3 84 62 55 56

E-mail: comm.france@vetoquinol.com

Vetoquinol S.A.

Magny-Vernois - 70200 Lure

France

Tel: :+33 3 84 62 56 36

Fax: +33 3 84 62 55 56

E-mail: comm.france@vetoquinol.com