

Зустрічайте АпКард - Перший м'який діуретик для собак!

1 г препарату містить діючу речовину:
торасемід - 0,01 г.

Дозування і способи введення тваринам різного віку

Пероральне застосування собакам самостійно або разом із кормом.

Рекомендована доза торасеміду — 0,1-0,6 мг на 1 кг маси тіла, один раз на день.

Більшість собак стабілізується при дозі торасеміду меншій або рівній 0,3 мг на 1 кг маси тіла, одноразово щоденно.

Дозу слід титрувати, щоб підтримувати комфорт тварини, звертаючи увагу на функцію нирок та електролітний стан. Якщо рівень діурезу потребує зміни, дозу можна збільшити або зменшити в межах рекомендованого діапазону доз із кроком 0,1 мг/кг маси тіла. Після того, як ознаки застійної серцевої недостатності купіровані і стан тварини стабільний та якщо тривалу терапію діуретиком торасемідом необхідно продовжувати, лікування слід надавати у найнижчій ефективній дозі.

Часті повторні огляди собаки сприятимуть встановленню відповідної дози діуретика.

Добовий графік застосування препарату може бути прилаштований для контролю періоду сечовипускання відповідно до потреби.

Особливі заходи зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 15 до 25 °С.