



АМОКСИНСОЛ 50

Амоксициліну ►
тригідрат
АМОХИНСОЛ 50 ►
порошок для
орального
застосування

50%

2,5 КГ

 **vetoquinol**

Власник реєстраційного посвідчення / Виробник
готового продукту: Ветоквінол Біовет Сп з о.о.

13-14 Косінієров Гдинських вул.,

66-400 Гожув Влкл.; Польща

Тел. +48 95 728 55 62; Факс +48 95 728 55 62

E-mail: info@vetoquinol.pl

Реєстраційне посвідчення: АА-01157-01-10

Склад:

1000 мг препарату містить діючу речовину: амоксициліну тригідрат – 500 мг. Допоміжні речовини: кислоти лимонної ангідрид 50%. **Опис:** Порошок білого кольору.

Фармакологічні властивості

Амоксициклін – напівсинтетичний антибіотик з групи амінопеніцилінів. Він блокує синтез клітинних стінок бактерій, гальмує ферменти транспептидази і карбоксипептидази, викликає порушення осмотичного балансу, що приводить до загибелі мікроорганізмів на стадії розвитку.

Препарат активний проти грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів (*Actinomyces spp.*, *Bacillus anthracis*, *Clostridium spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Streptococcus spp.*, *Listeria monocytogenes*, *E. coli*, *Actinobacillus spp.*, *Bordetella bronchiseptica*, *Fusobacterium spp.*, *Haemophilus spp.*, *Moraxella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Proteus mirabilis*, *Salmonella spp.*).

Застосування

Лікування свиней, бройлерів, качок та індиків, хворих на пастерельоз, колібацильоз, сальмонельоз, а також при захворюваннях травного каналу, органів дихання та сечостатевої системи, шкіри та м'яких тканин, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до амоксициліну.

Дозування

Перорально з питною водою у дозі:

бройлери – 150 г препарату на 450 л питної води або 15 мг амоксициліну тригідрату на 1 кг маси тіла протягом 3-5 діб.

150 г препарату достаньо для:

Бройлери	
Вік в тижнях	Кількість птиці (голів)
1	30,000
2	13,500
3	7,500
4	5,000
6	3,000
8	2,000

Для застосування у ветеринарній медицині!
Сухе, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 15° С до 25° С.

качки – 20 мг амоксициліна тригідрату на 1 кг маси тіла протягом 2-3 діб;

індики – 15-20 мг амоксициліна тригідрату на 1 кг маси тіла протягом 5 діб;

свині – 20 мг амоксициліна тригідрату на 1 кг маси тіла протягом 5 діб. Добову дозу розділяють на два рази і задають з інтервалом 12 год.

Лікарський розчин готують кожний день, якщо він не використаний протягом 12 год його виливають. Під час лікування інших джерел для пиття не повинно бути.

Протипоказання

Підвищена чутливість до амоксициліну. Не застосовувати кролям, мурчакам, хом'якам чи іншим дрібним травоядним тваринам. Не застосовувати одночасно з антибіотиками групи цефалоспоринов, тетрациклінов, макролідів. Не застосовувати курам-несучкам, яйця яких застосовуються в їжу людям, а також тваринам із порушеною функцією нирок.

Застереження

Забій тварин на м'ясо дозволяється відповідно через 1 (бройлери), 9 (качки), 5 (індики) та 2 (свині) доби після останнього застосування препарату. Отримане, до зазначеного терміну, м'ясо утилізують або згодують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

Термін придатності – 18 міс.